Состав
Гель травильный содержит 37% раствор фосфорной кислоты.

Свойства
Гель обладает тиксотропными свойствами, благодаря чему он легко фиксируется на поверхности зуба и выполняет быстрое и качественное удаление смазанного слоя и травление тканей.

Применение
Необходимое количество геля выдавливают из шприца через канюлю в кювету или на стекло, затем кисточкой наносят на эмаль и дентин. В некоторых случаях гель можно наносить непосредственно на обрабатываемую поверхность зуба. Выдержка геля должна составлять на эмали 30 с. и дентине 15 с.
По истечении времени обработки травильный гель тщательно смывают в течении
10 – 15 с. струей воды под давлением и сушат 15 с. чистым сжатым воздухом до слегка увлажненного состояния дентина и потускнения эмали. При повышенной резистентности эмали травление необходимо повторить (не более 30 с.). Канюлю после использования промывают водой при помощи шприца.

Рекомендации
При длительном хранении травильного геля возможно его загустевание. Для исключения разбрызгивания геля при дозировании поршень шприца предварительно необходимо оттянуть на себя на 2 – 3 мм, а для получения требуемой консистенции гель необходимо выдавить на стекло и немного перемешать.

Условия хранения и маркировка
Условия хранения
Гель в упакованном виде должен хранится в закрытых, прохладных помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Маркировка
Символ ⌛ указывает рекомендуемый конечный срок использования изделия.
Символ **СР** в таблице обозначает номер свидетельства о государственной регистрации и дату его выдачи.